

دورة الأوائل

الرياضيات المتقدمة · الصف الثاني عشر · الفصل الدراسي الأول



الوحدة الرابعة

التفاضل

٢-٤ مشتقة دالة القوة

١-٤ المشتقة وعلاقتها بالميل

٤-٤ المماس والعمودي

٣-٤ قاعدة السلسلة

٦-٤ النقاط الحرجة

٥-٤ الدوال المتزايدة
والمتناقصة



اسم الطالب:

إعداد: د. صهيب سليمان - الأول على السلطنة ·
math.sh3la.net

قواعد الاشتقاق

$$\frac{d}{dx}(d \pm e) = d' \pm e'$$

$$\frac{d}{dx}(k(d(s))) = k'(d'(s))$$

$$\frac{d}{dx}(j) = 0$$

$$\frac{d}{dx}(s^n) = n s^{n-1}$$

$$\frac{d}{dx}(d(s)^n) = n(d(s))^{n-1} \times d'(s)$$

$$\text{قاعدة السلسلة: } \frac{d}{dx} \left(\frac{v}{e} \right) = \frac{v'}{e} \times \frac{e}{e'}$$

$$(h \circ d)'(s) = h'(d(s)) \times d'(s)$$

• قبل الاشتقاق: اكتب $\sqrt{s} = s^{\frac{1}{2}}$ ، $s^{-1} = \frac{1}{s}$ ، وفك الأقواس واقسم الكسر على المقام إذا كان المقام حدًا واحدًا.

• المشتقة الثانية: $\frac{d}{dx} \left(\frac{v'}{e} \right) = \frac{v''}{e} - \frac{v' e'}{e^2}$ وتكتب أيضًا د"(s).

التماس والعמודي عند النقطة (s₁ , v₁)

$$\text{ميل العمودي} = -\frac{1}{m}$$

$$\text{التماس: } v - v_1 = m(s - s_1)$$

$$\text{ميل التماس } m = \frac{v'}{e} \text{ عند } s = s_1$$

$$\text{العمودي: } v - v_1 = -\frac{1}{m}(s - s_1)$$

- إذا كان $m = 0$: التماس أفقي ($v = v_1$) والعمودي رأسي ($s = s_1$).
- المستقيمان المتوازيان لهما الميل نفسه، والمتعامدان حاصل ضرب ميليهما = -1.
- نقطة التقاطع مع محور الصادات: $s = 0$ ، ومع محور السينات: $v = 0$.

التزايد والتناقص والنقاط الحرجة

$\frac{v}{e}$	$<$	$>$	$=$
الدالة	متزايدة	متناقصة	نقطة حرجة

اختبار المشتقة الثانية: $\frac{v''}{e} > 0 \Rightarrow$ عظمى ، $\frac{v''}{e} < 0 \Rightarrow$ صغرى ، $\frac{v''}{e} = 0 \Rightarrow$ استخدم اختبار المشتقة الأولى

اختبار المشتقة الأولى: إشارة $\frac{v'}{e}$ قبل وبعد النقطة: (+ ثم -) عظمى ، (- ثم +) صغرى ، (لا تتغير) انعطاف

- لإيجاد مجال التزايد: حل المتباينة $\frac{v'}{e} > 0$ (ارسم قطع المشتقة أو جدول الإشارات).
- لإيجاد النقطة الحرجة: حل $\frac{v'}{e} = 0$ لتجد s ، ثم عوض في الدالة الأصلية لتجد v .

القسم ١ الآلة الحاسبة في هذه الوحدة

٢٠٢٣/٢٠٢٤ دور أول ٠ س٥

قيمة المشتقة: d/dx

السؤال: ص = $4x^5 + 2x^3 - x - 1$. (ظّل الشكل المقترن بقيمة $\frac{d}{dx}$ عند $x = -1$)
عند $x = -1$: $25, 4, 7, 27$

اضغط بالترتيب:

Math ▲
 $d/dx(4x^5+2x^3-x-1) | x=-1$
25

SHIFT f 4 ALPHA) x 5 + 2 ALPHA) x³ - ALPHA) - 1 (- 1 =

← الآلة تحسب ميل المماس مباشرة: الجواب ٢٥ (زر d/dx هو SHIFT ثم f)

٢٠٢٤/٢٠٢٥ دور أول ٠ س١٣

السؤال: ع(س) = (هـ ∘ د)(س) ، د(س) = $2s + 1$ ، هـ(س) = $\sqrt[3]{s}$. أوجد ع'(س) (حلّك: $\frac{3}{1+2s}$ ، تحقق عند $s = 4$)

اضغط بالترتيب:

Math ▲
 $d/dx(3\sqrt[3]{2x+1}) | x=4$
1

SHIFT f 3 √ 2 ALPHA) + 1 = → 3 ÷ √ 9 =

← الآلة تعطي ١ ، وحلّك عند $s = 4$ يعطي $\frac{3}{9} = 1$ المشتقة صحيحة

٢٠٢٤/٢٠٢٥ دور أول ٠ س١٤

النقاط الحرجة: EQN السؤال: منحنى الدالة $V = s^3 - 3s^2 - 9s + 1$. أوجد إحداثيات النقاط الحرجة الواقعة على منحنى الدالة.

اضغط بالترتيب:

Math ▲
 $3X^2-6X-9=0$
X1=3 X2=-1

MODE 5 3 → 3 = (-) 6 = (-) 9 = = → =

← من $\frac{ص}{س} = 3s^2 - 6s - 9$ ، $s = 3$ ، $s = -1$ ، ثم عوّض في الدالة (بزر CALC): (٣) ، (١-)

٢٠٢٣/٢٠٢٤ دور أول ٠ س٦

السؤال: ص = $s^3 + 3s^2$ والنقاط الحرجة (٠ ، ٠) ، (٤ ، ٢-). حدّد طبيعة النقاط الحرجة باستخدام اختبار المشتقة الثانية.

نوع النقطة: d/dx للمشتقة

اضغط بالترتيب:

Math ▲
 $d/dx(3X^2+6X) | x=0$
6

SHIFT f 3 ALPHA) x² + 6 ALPHA) 0 =

← اشتقاق المشتقة الأولى يعطي $\frac{ص}{س} = 6s + 6 > 0 < 6$ صغرى. كرر عند $s = -2$ فتحصل على $-6 > 0 < -2$ عظمى

٢٠٢٥/٢٠٢٦ دور ثاني ٠ س٢٢

نظام معادلتين: EQN السؤال: ميل المماس لمنحنى الدالة $V = 2s^3 + 3s^2 + b$ عند النقطة (٦ ، ٢) يساوي ٧ . أوجد قيمتي أ ، ب

نظام معادلتين: EQN

اضغط بالترتيب:

Math ▲
 $4X+Y=-17$, $4X+2Y=-14$
X=-5 Y=3

MODE 5 1 → 4 = 1 = (-) 1 7 = 4 = 2 = (-) 1 4 = =

← من الميل: $4 = b + 2$ ، ومن النقطة: $4 = 2 + 3$ ، $5 = b$ ، $3 = b$

المشتقة وعلاقتها بالميل

١-٤

الفكرة ببساطة

ميل الوتر بين نقطتين على المنحنى $= \frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}}$. كلما اقتربت النقطة الثانية من الأولى اقترب ميل الوتر من ميل المماس. هذه النهاية هي المشتقة $\frac{ص}{س}$ أو د'(س): دالة نعوض فيها لنعرف ميل المنحنى عند أي نقطة.

أهداف التعلم (دليل المعلم)

- يفهم (من خلال التمثيل البياني للدالة) أن ميل الدالة عند نقطة هو عبارة عن نهاية الميل لمتتالية مناسبة من المماسات عند تلك النقطة. وعلاقته بمشتقة الدالة. ويستخدم الصيغ د'(س)، د''(س)، $\frac{ص}{س}$ ، $\frac{ص}{س}$ للمشتقتين الأولى والثانية.

ماذا سنتعلم؟

- ميل الوتر وتقدير ميل المماس من سلسلة أوتار.
- تعريف المشتقة كنهاية (الاشتقاق من المبادئ الأولية).
- الرموز $\frac{ص}{س}$ ، د'(س)، $\frac{ص}{س}$ ، د''(س).

أمثلة الشرح

مثال ١ كتاب الطالب ص ١٤٢

سلسلة من الأوتار مرسومة من النقطة ل(١، ٥) إلى النقاط أ(٩٧، ٩٤)، ب(٩٨، ٩٦)، ج(٩٩، ٩٨)، د(٩٩، ٩٨)، هـ(٩٩، ٩٨) الواقعة على المنحنى $ص = س^٢ + ٤$:

- أوجد ميل كل وتر من الأوتار ل، أ، ب، ج، د.
ب استخدم سلسلة ميول الأوتار لتقدير قيمة ميل مماس المنحنى عند النقطة ل.

تمارين

١ كتاب الطالب - تمارين ١-٤ س ٢

استخدم سلسلة من ميول الأوتار المناسبة لتجد ميل المماس لمنحنى كل دالة عند النقطة المعطاة:

- أ $ص = س^٤$ ، عند (١، ١) ب $ص = س^٤ - س^٢ + ٣$ ، عند (٤، ٤) ج $ص = \sqrt{س}$ ، عند (٤، ٤) د $ص = \frac{١٢}{س}$ ، عند (٦، ٢)
عند (٣، ٠)

الفكرة ببساطة

«اضرب المعامل في القوة، واطرح واحدًا من القوة». قبل الاشتقاق حوّل الجذور والكسور إلى قوى، وفكّ الأقواس. المشتقة الثانية هي مشتقة المشتقة.

أهداف التعلم (دليل المعلم)

- يجد ويستخدم مشتقة لدوال في الصيغة د(س) = س^ن (لأي عدد نسبي ن)، مع الضرب في ثابت، والجمع والطرح للدوال.

ماذا سنتعلم؟

- اشتقاق س^ن لأي عدد نسبي ن.
- مشتقة الثابت، والضرب في ثابت، والجمع والطرح.
- ميل المماس عند نقطة، وإيجاد ثوابت من الميل، والمشتقة الثانية.

أمثلة الشرح

مثال ٣ كتاب الطالب ص ١٤٦

أوجد مشتقة الدالة د(س) = ٣س^٤ - $\frac{1}{س^2}$ + $\frac{٤}{\sqrt{س}}$ + ٥ بدلالة س.

مثال ٥ كتاب الطالب ص ١٤٧

إذا كان ميل المماس لمنحنى الدالة ص = أس^٤ + ب س^٢ + س يساوي ٣ عند س = ١، ويساوي -٥ عند س = ٢، فأوجد قيمتي أ، ب.

مثال ٧ كتاب الطالب ص ١٤٨

إذا علمت أن د(س) = (٢س^٢ - ٥)(س + ١)، فأوجد:

- أ د(س) ب مجال قيم س عندما تكون د(س) موجبة.

تمارين

١ كتاب الطالب - تمارين ٢-٤ س ١ + س ٣

أوجد المشتقة الأولى بدلالة س لكل مما يأتي:

- أ د(س) = س^٩ ب د(س) = س^٤
ج ص = ٧س^٢ - $\frac{٣}{س}$ + $\frac{٢}{س^2}$ د ص = $\frac{٤س^٢ + ٣س - ٢}{\sqrt{س}}$

لاشتقاق قوس مرفوع لقوة: اضرب في القوة، واطرح واحدًا منها، ثم اضرب في **مشتقة ما داخل القوس**. وللدالة المركبة (ه • د) $(س) = ه'(د(س)) \times د'(س)$.

- اشتقاق ((دس))^١ والجذور والكسور ذات المقام المركب.
- مشتقة الدالة المركبة.
- إيجاد ثوابت من الميل باستخدام قاعدة السلسلة.

٢

كتاب الطالب · تمرين ٣-٤ س ٤ + س ٧

أوجد ميل المماس لمنحنى الدالة $v = (3 - s)^0$ عند النقطة (١, ٢).

ب أوجد إحداثيات النقطة التي يكون عندها ميل المماس لمنحنى الدالة $v = \sqrt{s^2 - 10s + 26}$ يساوي صفرًا.

٣

كتاب الطالب · تمرين ٣-٤ س ١٢

إذا علمت أن الدالة $v(s) = \sqrt{\frac{1-s^2}{s}}$ فأوجد:

أ $v'(s)$.

ب قيمة s عندما يكون ميل المماس لمنحنى الدالة $v(s)$ عند $s = \frac{1}{3}$ يساوي $\frac{1}{3}$.

٤-٤

المماس والعمودي

الفكرة ببساطة

ميل المماس = قيمة المشتقة عند النقطة. **العمودي** هو المستقيم العمودي على المماس عند نقطة التماس. فميله $-\frac{1}{m}$.
تحتاج دائمًا: نقطة + ميل، ثم $v - v_0 = m(s - s_0)$.

أهداف التعلم (دليل المعلم)

- يجد ويستخدم ميل المماس أو المستقيم العمودي على منحنى الدالة، أو معادلة المماس و/أو معادلة المستقيم العمودي لدوال في الصيغة $v(s) = \dots$ (لأي عدد نسبي n)، مع الضرب في ثابت، والجمع، والطرح للدوال، والدوال المركبة باستخدام قاعدة السلسلة.

ماذا سنتعلم؟

- معادلة المماس ومعادلة العمودي عند نقطة.
- نقاط تقاطع المماس أو العمودي مع المحورين أو مع المنحنى مرة أخرى.
- إيجاد ثوابت إذا عُلم ميل المماس أو العمودي أو معادلته.

أمثلة الشرح

مثال ١٤ كتاب الطالب · ص ١٥٩

أوجد معادلتى المماس والعمودي لمنحنى الدالة $v = s^2 + \frac{1}{s}$ عند $s = 2$.

مثال ١٥ كتاب الطالب · ص ١٦٠

إذا علمت أن معادلة منحنى الدالة $v = (4 - \sqrt{s})^3$ ، وكان العمودي عند النقطة ل(٨, ٤) يتقاطع مع العمودي عند النقطة ن(٩, ١) في النقطة ر، فأوجد إحداثيات النقطة ر.

تعارین

كتاب الطالب · تمارين ٤-٤ س ٣

إذا علمت أن منحنى الدالة $v = \frac{\Lambda}{r(r+s)}$ يمر بالنقطة $A(r, \frac{1}{r})$ ، فأوجد:

أ. معادلة مماس المنحنى عند النقطة أ. ب. معادلة العمودي على المنحنى عند النقطة أ.

٢ كتاب الطالب · تمارين ٤-٤ س ٤

إذا كانت معادلة منحنى الدالة $v = 5 - s^3 - 2s^2$:

١. بيّن أن معادلة العمودي على المنحنى عند النقطة $(-2, 3)$ هي $5x + 3y = 13$

ب أوجد إحداثيات النقطة الثانية التي يتقاطع فيها العمودي مع المنحنى.

٣ كتاب الطالب · تمارين ٤-٤ س ١٣

إذا علمت أن منحنى الدالة $v = s(s - 1)(s + 2)$ يتقاطع مع محور السينات في النقاط $(0, 0)$ ، $(1, 0)$ ، $(-2, 0)$ ، وعموديان على المنحنى عند النقطتين أ، ب يتقاطعان في النقطة ج، فأوجد إحداثيات النقطة ج.

4 كتاب الطالب · تمارين ٤-٤ س ١٦

إذا علمت أن العمودي على منحنى الدالة $v = 2s^r + k$ س - ٣ عند النقطة (٣، -٦) يوازي المستقيم $s + ٥v = ٠$ ، فأوجد:

أ قيمة ك.

ب إحداثيات النقطة الثانية التي يتقاطع فيها العمودي والمنحنى.

0 كتاب الطالب · مراجعة الوحدة ١٢ ★

إذا علمت أن منحنى الدالة $v = s^3 - \frac{x}{s}$ يمر بالنقطتين أ(١، -١)، ب(٤، ١١)، وأن المماس عند كل من النقطتين ج، د يوازي القطعة المستقيمة أ ب، فأوجد معادلة العمودي المنصف للقطعة المستقيمة ج د.

١ كتاب الطالب · مراجعة الوحدة س١٤ ★

ليكن $ص = ٣ + ٤س - س^٢$:

- أ. بيّن أن معادلة العمودي على منحنى الدالة $ص$ عند النقطة $(٦, ٣)$ هي $ص = ٩ + ٢س$
- ب. إذا علمت أن العمودي عند النقطة $(٦, ٣)$ يتقاطع مع محوري الإحداثيات في النقطتين أ، ب، فأوجد إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة أ ب.
- ج. أوجد إحداثيات النقطة التي يتقاطع فيها العمودي مع المنحنى مرة أخرى.

٤-٥ الدوال المتزايدة والمتناقصة

💡 الفكرة ببساطة

إشارة المشتقة الأولى تخبرك باتجاه المنحنى: موجبة $\Leftarrow$ صاعد (متزايدة)، سالبة $\Leftarrow$ نازل (متناقصة). لإيجاد المجال حل المتباينة $\frac{ص}{س} < ٠$ أو > ٠ ، وإذا كانت المشتقة تربيعية فارسمها وانظر أين تكون فوق المحور أو تحته.

🎯 أهداف التعلم (دليل المعلم)

- يُجد ويستخدم المشتقة الأولى ليحدّد قيم $س$ التي تكون عندها الدالة في الصيغة $د(س) = س^٢$ (لأي عدد نسبي $ن$)، مع الضرب في ثابت، والجمع، والطرح، متزايدة، أو متناقصة.

🎨 ماذا سنُتعلم؟

- تحديد مجال التزايد والتناقص.
- حل متباينات تربيعية بالرسم أو جدول الإشارات.
- إثبات أن دالة متزايدة أو متناقصة دائمًا.

أمثلة الشرح

مثال ١٦ كتاب الطالب · ص١٦٥

أوجد مجموعة قيم $س$ بحيث تكون الدالة $ص = ٨ - ٣س - س^٢$ متناقصة.

تمارين

١ كتاب الطالب · تمارين ٤-٥ س١ + س٢

أوجد مجموعة قيم $س$ عندما تكون كل دالة متزايدة (أ، ب) أو متناقصة (ج، د):

- أ. $د(س) = ٥ - ٧س - ٢س^٢$
- ب. $د(س) = ٣س^٣ - ١٢س^٢ + ٢$
- ج. $د(س) = ٣س^٣ - ٣س^٢ - ٩س + ٥$
- د. $د(س) = ٣س^٣ - ٢١س^٢ + ٦٠س - ٥$

٢ كتاب الطالب · تمارين ٤-٥ س٣

أوجد قيم $س$ عندما تكون $د(س) = \frac{١}{٢}(٥ - ٢س) + ٤س$ متزايدة.

70  $\varepsilon \circ$

7-0

RV-

۱-۱ ۲۰۲۳/۲۰۲۴ · دور ثانی · سه

○ 425- 17 + 1 - 1

$$\varepsilon + \gamma + \gamma - \varepsilon = 0$$
$$\bigcirc - 18s + 3s^2 - 1$$
$$\varepsilon + \lambda^3 + \lambda - 1 = 0$$

○ $\sqrt{\text{س}}$

 $\frac{1}{\sqrt{s}}$
$$\sqrt{s} = 0$$
$$\frac{1}{\sqrt{s}} - 0$$
$$\sqrt{\varepsilon} \approx \varepsilon - \frac{1}{2}$$
 $\sqrt{\epsilon} \text{ } ^3\epsilon \text{ } \bigcirc$
$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon \sqrt{\mu}} = 0$$
$$\frac{\varepsilon}{\varepsilon \sqrt{\mu}} \quad \bigcirc$$

r O

Λ-

Λ □

1-0

ΓΕ

IA ☐

9 00

10

10

r O

1-0

7-0

۲۰۲۳/۲۰۲۴ · دور اول · س ۱۹

۱-۲ ۲۰۲۳/۲۰۲۴ · دور ثانی · س ۱۹

↪ **نفس الفكرة في امتحانات أخرى — حلّها بنفس الطريقة:**

٨-أ ٢٠٢٥/٢٠٢٤ · دور ثاني · س١٢

منحنى الدالة $v = s^1 + s^2 - s^3$. أوجد إحداثيات النقطة الحرجة الواقعة على منحنى الدالة، وحدد نوعها [٥]

۸-ب ۱۴۰۲/۲۰۲۵ · دور ثانی · س ۶

لمنحني الدالة $v = s^{\epsilon} - \alpha s^{\tau}$ نقاط حرجية . باستخدام اختبار المشتقة الأولى حدد نوع النقاط الحرجية [٥]

٨-ج ٢٠٢٥/٢٠٢٦ · دور أول · س٦٦ ⚠️ قدرات عليا

منحنى الدالة $v = s^3 - أس + ا + له نقطة حرجة عند (ا, ٥) ونقطة حرجة عند (س١, ص١)$. حدد نوع النقطتين الحرجتين

[٥]

خلاصة الوحدة: انتبه لهذه الأخطاء

من الامتحانات الوزارية



جاءت هذه الوحدة بـ ٢٤ درجة من ٧٠ في ٢٠٢٤ (١٠ أسئلة)، و ١٧-١٨ درجة في ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦ (٧ أسئلة). أغلبها مباشر لمن ينتبه لهذه النقاط:

١) حوّل قبل الاشتقاق

$\frac{12}{\sqrt{3}} = \frac{12}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 4\sqrt{3}$ و $\sqrt{2} = \sqrt{2}$. أكثر الأخطاء في القوى السالبة والكسرية.

٢٠٢٥ أول س ١٤ - ٢٠٢٦ أول س ٨

٢) مشتقة ما داخل القوس

في $(٣ + ٥س)^٤$ المشتقة $٢٠(٣ + ٥س)^٣$ لا $٤(٣ + ٥س)^٣$. لا تنسَ الضرب في ٥.

٢٠٢٦ ثاني س ٨ - ٢٠٢٥ ثاني س ٢٩

٣) ترتيب التركيب

(هـ + د) (س) = هـ (د (س)) : ابدأ بالدالة اليمنى. اكتب الدالة المركبة أولاً ثم اشتق.

٢٠٢٤ س ١٩ - ٢٠٢٥ س ١٣ و ٢٦

٤) العمودي ≠ المماس

ميل العمودي = $-\frac{1}{m}$. خيارات الاختيار من متعدد تضع ميل المماس وعكسه دون إشارة لتخدعك.

٢٠٢٤ أول س ٢٣ - ٢٠٢٥ ثاني س ١٤

٥) ص من الدالة لا من المشتقة

بعد إيجاد س من $\frac{ص}{س} = ٠$ عوّض في الدالة الأصلية لتجد ص.

٢٠٢٤ ثاني س ١٢ - ٢٠٢٥ أول س ٢١

٦) المتباينة التربيعية

ل س $٢ - ٤ > ٠$. الجواب $٢ > ٤$ (بين الجذرين). ولا $٠ < ٠$ خارج الجذرين. ارسم قطع المشتقة.

٢٠٢٤ أول س ١٢ - ٢٠٢٤ ثاني س ٧

٧) رسم المشتقة لا الدالة

إذا أعطاك بيان د' (س): الدالة متناقصة حيث يكون الرسم تحت محور السينات.

٢٠٢٤ ثاني س ٧

٨) نقطة على المستقيم وعلى المنحنى

نقطة التماس تحقق معادلة المنحنى ومعادلة المستقيم معًا، وميلها = ميل المستقيم (أو سالب مقلوبه للعمودي).

٢٠٢٦ أول س ١٥ - ٢٠٢٦ ثاني س ١٥

٩) معلومتان = معادلتان

نقطة على المنحنى تعطي معادلة، والميل أو النقطة الحرجة تعطي معادلة أخرى. حلّهما معًا (EQN).

٢٠٢٦ ثاني س ٢٢ - ٢٠٢٦ أول س ٢٦

١٠) الاختبار المطلوب

إذا طُلب «اختبار المشتقة الأولى» فارسم جدول الإشارات، ولا تكثف بالمشتقة الثانية – وإلا تخسر درجة الطريقة.

٢٠٢٦ ثاني س ٢٦

أسئلة كامبريدج

منحنى معادلته $ص = اس^2 + \frac{ا^2}{س}$. أوجد معادلة المماس للمنحنى عند النقطة $(-2, 1)$ في الصورة $ص = م س + ج$ [٤]

4

منحنى معادلته $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. أوجد معادلة العمودي على المنحنى عند النقطة (١, ٢) في الصورة أس + ب ص + ج = ٠، حيث أ، ب، ج أعداد صحيحة. [٦]

7

للمنحنى $v = s - \frac{1}{s}$ نقطة حرجة عند $(-3, 0)$. أوجد قيمتي الشاكتين أ، ب. [٤]

E

منحنى معادلته $ص = \frac{1}{r} - \alpha س$ ، حيث $س < 0$ و α ثابت. للمنحنى نقطة حرجة عند النقطة ل التي إحداثيها السيني ٩ . أوجد الإحداثي الصادي للنقطة ل. [٥]

9

معادلة منحنى ص = r^2 - $\frac{1}{r^2}$ + 3 .

i أوجد إحداثيات النقطة الحرجة. [٣] **ب** حدّد نوع النقطة الحرجة. [٢] **ج** للقيم الموجبة لـ s ، حدّد ما إذا كان المنحنى يمثل دالة متزايدة أو متناقصة أو غير ذلك، مع ذكر السبب. [٢]

7

منحنی معادلتہ ص = $\frac{9}{5 - \sqrt{x}}$ + ۵ -

أُوجد إحدائيات النقطتين الحرجتين. [٤]

ب أوجد $\frac{r_v}{r_s}$ ومن ثمّ حدّد نوع كل نقطة حرجة. [٣]

مفاتيح الإجابة

الدرس ١-٤ المشتقة وعلاقتها بالميل

مثال ١ (أ) ٢,٩١٠.٩ ، ٢,٩٤٠.٤ ، ٢,٩٧٠.١ ، ٢,٩٨٥.٢ (ب) ٣

١ (أ) ٤ (ب) ٢- (ج) $\frac{1}{r}$ (د) ٣-

الدرس ٢-٤ مشتقة دالة القوة

مثال ٣ $١٢س^٣ + \frac{١}{س^٣} - \sqrt[٣]{\frac{٢}{س}}$

مثال ٧ (أ) ١٢س + ٤ (ب) س < $\frac{1}{3}$

مثال ٥ $٣ = ب , ٢ = أ$

١ (أ) ٩س^٨ (ب) $-\frac{٤}{س^٥}$ (ج) $٤س + \frac{٣}{س} - \frac{٤}{س^٣}$ (د) $\sqrt[٣]{\frac{1}{س}} + \sqrt[٣]{\frac{٣}{س}} + \sqrt[٣]{\frac{1}{س}}$

٣ (أ) س > $\frac{r}{3}$ (ب) س < $\frac{1}{r}$

٥ (أ) $\frac{٤}{س^٣} = ١٢$ (ب) ١٥

٢ (أ) ٣ (ب) ٥- (ج) $-\frac{٥}{٤}$

٤ (أ) ٥ = أ ، ٥ = ب ، ٢ = ج (ب) أ = ٤ ، ب = ٦-

٦ $-\sqrt[٣]{٣} \geq س > ٠$ أو $٠ > س \geq \sqrt[٣]{٣}$

الدرس ٣-٤ قاعدة السلسلة

مثال ٩ $-\frac{٦٠س}{١ + (٣س)^٦}$

مثال ١١ (أ) ١٠.٨س (٩س + ٧) (ب) الناتج نفسه

مثال ١٠ $٨ = ب , ٢ = أ$

١ (أ) $٢- (٣س - ٤س)$ (ب) $\frac{٥(٣س + ٥)(٥ - ٣س)}{س}$ (ج) $-\frac{٣}{(٥ - س)}$ (د) $-\frac{٣٣٢}{(٢ + ٣س)}$ (هـ) $\frac{٢س}{١ - ٣س}$

٣ (أ) $٢' (س) = \sqrt[٣]{\frac{1}{٣س - ٤س}}$ (ب) $\frac{٩}{٨} = ك$ (ج) $١٢٥ = ٩$

٢ (أ) ١٠ (ب) (١.٥)

الدرس ٤-٤ المماس والعمودي

مثال ١٤ المماس: ص = ٦س - ١١ ، العمودي: س + ٦ص = ٨

١ (أ) س + ٤ص = ٤ (ب) ص = ٤س - ٧,٥

٣ (ج) (٤.١)

٥ ص = $\frac{1}{r}$

مثال ١٥ (١١,٤ ، ١٤,٢) ر

٢ (أ) برهان (ب) (٢,٤٨ ، ٠,٦)

٤ (أ) ك = ٧- (ب) (٠,٤٨ ، ٠,٢٤)

٦ (أ) برهان (ب) $(-\frac{9}{٤}, \frac{9}{r})$ (ج) $(\frac{1}{٤}, ٧٥)$

الدرس ٥-٤ الدوال المتزايدة والمتناقصة

مثال ١٦ س < $\frac{٣}{r}$

١ (أ) س > ١,٧٥ (ب) س > ٠ أو س < ٨ (ج) ١- > س > ٣

(د) ٢ > س > ٥

٢ ١,٥ > س > ٣,٥

٣ د' (س) = $\frac{٨}{r(٣س - ١)}$ < ٠ < متزايدة

٤ ٧ > س > ٢٠ ، س عدد صحيح

الدرس ٦-٤ النقاط الحرجة

مثال ٢٠ (٦- ، ٣-) عظمى ، (٦.٣) صغرى

١ (أ) (٢٢ ، ٢-) عظمى ، (١- ، ٢) صغرى (ب) (٤- ، ١-) صغرى (ج) (١٢ ، ١) صغرى (د) (١٢- ، ٣-) عظمى ، (٠ ، ٣) صغرى

٣ (أ) ٣ = أ ، ٣- > س > ١ (ب) أ = ١٥- ، ب = ٣٦ : (٢- ، ٢) عظمى

٢ $\frac{٤}{س} = ١ + \frac{٩}{س}$ ≠ ٠ لا توجد نقاط حرجة

الأسئلة الوزارية

أ-١	٢٥	أ-١	٢٥
ب-١	$\frac{١}{٢\sqrt{٢}}$	ب-١	$\frac{١}{٢\sqrt{٢}}$
د-١	٢	د-١	٢
و-١	٢	و-١	٢
أ-٢	$ع'(س) = ٢٠ + ٤س$	أ-٢	$ع'(س) = ٢٠ + ٤س$
ج-٢	$٢٢س^٣$	ج-٢	$٢٢س^٣$
ه-٢	$د'(س) = -٢س(٥ - \frac{٣٦}{٤س})$	ه-٢	$د'(س) = -٢س(٥ - \frac{٣٦}{٤س})$
٣	٥	٣	٥
ب-٣	$ص = -٤س + ٦$	ب-٣	$ص = -٤س + ٦$
د-٣	$ص = ٢س - ٢$	د-٣	$ص = ٢س - ٢$
٤	$\frac{٢}{٧}$	٤	$\frac{٢}{٧}$
ب-٤	$٢-$	ب-٤	$٢-$
د-٤	$ص = -٣س + ٣$	د-٤	$ص = -٣س + ٣$
أ-٥	$ق = ٢$	أ-٥	$ق = ٢$
٦	$٢- > ٢س > ٢$	٦	$٢- > ٢س > ٢$
ب-٦	$٢- < ٢س$	ب-٦	$٢- < ٢س$
د-٦	$٢ > ٢س$	د-٦	$٢ > ٢س$
و-٦	$٥- > ٢س > ٣$	و-٦	$٥- > ٢س > ٣$
ج-٦	$٠ > ٢س > ٣$	ج-٦	$٠ > ٢س > ٣$
أ-٧	(١.٥) صغرى	أ-٧	(١.٥) صغرى
ج-٧	(٨.٤)	ج-٧	(٨.٤)
ه-٧	٥	ه-٧	٥
٨	(٠.٠) صغرى ، $(٤.٢-)$ عظمى	٨	(٠.٠) صغرى ، $(٤.٢-)$ عظمى
ب-٨	(٠.٠) عظمى ، $(١.١-)$ ، $(١-١-)$ صغرى	ب-٨	(٠.٠) عظمى ، $(١.١-)$ ، $(١-١-)$ صغرى

الملحق — أسئلة كامبريدج

٢	$٣س - ٨ص + ٢ = ٠$	٢	$٣س - ٨ص + ٢ = ٠$
٤	١٨	٤	١٨
٦	(أ) (١.٦) ، (٤.٦) (ب) $\frac{٧٢}{٣(٥-٢س)} = \frac{٤ص}{٢س}$: (١.٦) عظمى ، (٤.٦) صغرى	٦	(أ) (١.٦) ، (٤.٦) (ب) $\frac{٧٢}{٣(٥-٢س)} = \frac{٤ص}{٢س}$: (١.٦) عظمى ، (٤.٦) صغرى
٨	$٣ = ك$	٨	$٣ = ك$
١٠	(أ) $٥(٣-٢س) + ٥$ (ب) $د'(س) = ٥(٣-٢س) + ٥$ متزايدة	١٠	(أ) $٥(٣-٢س) + ٥$ (ب) $د'(س) = ٥(٣-٢س) + ٥$ متزايدة
١	$ص = ٩س + ٩$	١	$ص = ٩س + ٩$
٣	$أ = ٥٤$ ، $ب = ٢٧$	٣	$أ = ٥٤$ ، $ب = ٢٧$
٥	(أ) $(-\frac{١}{٢} , \frac{٩}{٢})$ (ب) صغرى (ج) متزايدة لأن $\frac{٤ص}{٢س} = ٤س + \frac{١}{٢س} > ٠$	٥	(أ) $(-\frac{١}{٢} , \frac{٩}{٢})$ (ب) صغرى (ج) متزايدة لأن $\frac{٤ص}{٢س} = ٤س + \frac{١}{٢س} > ٠$
٧	(أ) $ك = ١٦$ (ب) صغرى (ج) $د(س) \leq ١٤$	٧	(أ) $ك = ١٦$ (ب) صغرى (ج) $د(س) \leq ١٤$
٩	$ج = ٤$ ، $ل = (\frac{١}{٢} , ١)$: $ج = ١$ ، $ل = (٢.١١)$	٩	$ج = ٤$ ، $ل = (\frac{١}{٢} , ١)$: $ج = ١$ ، $ل = (٢.١١)$

الملحق — أسئلة القدرات العليا

١	أ = ٥ ، ب = ٧٤	٢	أ) ص = -س + ٥ (ب) ص = -١ ± ٢٧
٣	أ) $(٤, \frac{1}{٤})$ ، $(٤, -\frac{1}{٤})$ (ب) صفري	٤	أ) ص = -٥ + ٣٥ (ب) ص = ٣٠
٥	أ) ح = ٢ + $\frac{٥}{٢٢}$ (ب) نق = ٥ ، $\frac{٢}{٢٢}$ < ٠ < صفري ، ح = ٢٠ سم	٦	أ) $(٠, ١)$ ، $(١, ٢)$ (ب) رسم ج) ك > ١ أو ك < ٠



التاريخ

ملاحظات الختامية

الوحدة الرابعة: التفاضل – اكتب ما تعلمته، وما تريد أن تسأل عنه د. صهيبي.



لا تنس!

ملاحظاتي

✓ / □

✓ مهماتي

المهمة	أنجزت	لم أنجز
حل أمثلة الدروس الستة	☐	☐
حل تمارين الكتاب المختارة	☐	☐
حل الأسئلة الوزارية (٤٨ سؤالاً)	☐	☐
قراءة خلاصة الأخطاء الشائعة	☐	☐
حل أسئلة كامبريدج	☐	☐
حل أسئلة القدرات العليا	☐	☐
إتقان خطوات الآلة الحاسبة	☐	☐
مراجعة أخطائي من المفتاح	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐

مستوى إتقاني للوحدة

